Espèces intéressantes récoltées en 2004

par Alain BRISSARD

Sarcoscypha coccinea (Scop. : Fr.) Lambotte : Pézize écarlate

Cette belle espèce hivernale a été récoltée le 15 janvier 2004 sur branches tombées de feuillus recouvertes de mousses, dans une station humide à proximité d'un fossé garni d'eau et en bordure d'un sentier où croissent saules, aubépines et prunelliers.

Localisation : carte topographique 1/25000 Magnac-Laval ouest "La Tuillère" non loin du château de Sannot (Saint Junien-les-Combes).

Trois fructifications cupuliformes à marge légèrement enroulées (=apothécie) avaient un diamètre de 30 à 40mm et présentaient un hyménium rouge écarlate et un excipulum nettement plus pâle.
Observation microscopique de la couche hyméniale :

- Les asques sont octosporées et les spores sont hyalines et munies de fines gouttelettes aux deux extrémités.
- Les paraphyses sont peu ramifiées et dotées d'un contenu granuleux rouge orangé.

Boletus xanthocyaneus Ramain ex Romagnesi : Bolet jaune et bleu

Un seul spécimen jeune mais de toute beauté a été récolté le 2 août 2004 en lisière d'un large sentier et à proximité de chênes bordant une prairie. (Près du Dorat et à proximité du château d'Escurat : carte topographique de Magnac-Laval ouest).

Cette espèce bien que proche, par son aspect global, de la forme *xanthopurpureus* de *Boletus rhodopurpureus,* est néanmoins reconnaissable par la teinte jaune de la cuticule, des pores et du pied.

Le chapeau se caractérise d'autre part par l'existence de taches par places de couleur rouge cerise et par son revêtement subglabre plus ou moins bosselé. Il se macule instantanément de bleu noir au toucher.

Il possède un stipe très obèse entièrement jaune bouton d'or se tachant rapidement au toucher de bleu vert foncé intense puis noircissant.

Ce très beau bolet thermophile appartient à la série *torosus* ; il est même très proche de *Boletus torosus*, mais en diffère par ses couleurs jaunes persistantes.

Espèce réputée très rare dont l'identification a été confirmée par J.Charbonnel et S.Dunis.

Clavaria vermicularis Swartz : Fr. : Clavaire vermiculaire

Cette espèce de clavaire, assez peu courante, a été observée le 30 août 2004 dans un pré sous forme de petites touffes ou par groupes serrés.

Localisation : carte topographique 1/25000 Bellac est, à proximité du lieu-dit "chez Plument".

Les clavules sont fusiformes, cespiteuses, fragiles, très cassantes, à sommet aigu ou obtus, non ramifiées et d'un blanc pur.

Elles poussent dans l'herbe et ont une hauteur de 5 à 10cm et une épaisseur inférieure ou égale à 5mm. La portion pédiculaire est peu différenciée.

Bien que signalée comestible elle est trop ténue pour être consommée.

Les spores sont blanches (5-7µm x 3,5µm) lisses, elliptiques et même souvent en forme de pépin.